Naltrexona

Una pastilla diaria

Ayuda a reducir las ansias de tomar alcohol
Reduce la cantidad de alcohol que usted consume

COMO tomar Naltrexona

Antes de empezar:

1. Infórmele al personal si tiene historia de problemas del hígado como cirrosis, hinchazón del abdomen, coloración amarillenta de los ojos.

2. No tome Naltrexona si ha tomado cualquier narcótico como heroína, fentanilo, Subutex, Suboxone, metadona o tramadol en la última semana.

Instrucciones:

Tome **1** tableta de 50mg diariamente.
Comuníquese con su médico primario de 2 a 4 días después de haber empezado a tomar naltrexona para discutir si está funcionando.



Si tiene dolores estomacales o de cabeza:

Tome **½** tableta diaria por **3 días** y después **1** tableta entera cada día siguiente.

Por favor notifique al personal si sus síntomas de abstinencia empeoran y si la dosis del medicamento que está recibiendo no es suficiente para tratar sus síntomas de abstinencia.

Patrocinado por la Fundación Nacional de la Salud por medio del apoyo de la Fundacion Sierra Health MAT Access Points Project y desarrollado en colaboración con el Departamento de Servicios de la Salud del Condado de Los Angeles, CA Bridge, y el Programa El Tratamiento de la Addición Empieza Aquí del Centro de Innovación del Cuidado.